

## Nati dal 2012 al 2016

3° mese

**1° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**1° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

5° mese

**2° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**2° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

11° mese

**3° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV), Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

**3° dose: pneumococco** (vaccino contro la meningite da pneumococco; non obbligatorio)

13°-15° mese

**1° dose: morbillo, parotite, rosolia** (vaccino trivalente)

**meningococco C** (vaccino contro la meningite di tipo C)

5-6 anni\*

**4° dose (richiamo): difterite, tetano, pertosse, polio**

**2° dose: morbillo, parotite, rosolia** (vaccino trivalente)

**5-6 anni\*:**

**Le vaccinazioni previste in questa fascia di età normalmente sono effettuate a 5-6 anni (entro il compimento del 7° anno)**